



KOLONOSKOPIA (informacja o badaniu i zgoda(*) na jego wykonanie)

Kolonoskopię wykonuje się po odpowiednim oczyszczeniu jelita grubego.

Do oczyszczenia w przeddzień badania najczęściej stosuje się roztwór preparatu Fortrans. Oznacza to wstrzymanie się w tym dniu od spożywania posiłków i wypicie w godzinach popołudniowych zgodnie z instrukcją 4 litrów roztworu wyżej wymienionego środka. Badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, wprowadzanego przez odbytnicę do jelita grubego. Ewentualne dolegliwości towarzyszące badaniu związane są w dużej mierze ze wzdęciem spowodowanym podawaniem (insuflacją) powietrza do światła jelita umożliwiając jego pełną ocenę. Instrument służący do kolonoskopii jest dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Służą do tego sterylne szczypczyki, co również chroni przed zakażeniem. Jest także możliwość kojarzenia badania diagnostycznego (kolonoskopii) z ewentualnym równoczesnym zabiegiem leczniczym czyli np. usunięciem polipów.

Możliwe powikłania

Bezpieczeństwo badania nie może być zagwarantowane w 100%. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko. Należą do nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,14-0,18%), i krwawienie (0,008%), które wymagają zabiegu operacyjnego. Opisywane były także pojedyncze przypadki zaburzeń układu krążenia. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia i przedziurawienia jelita oraz zmniejszyć ryzyko przy ewentualnym podawaniu środków znieczulających bądź anestetycznych, prosimy o podkreślenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.	Czy istnieje zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?	TAK / NIE
2.	Czy podobne objawy występowały wśród członków rodziny	TAK / NIE
3.	Czy stosowane są leki wpływające na zmniejszenie krzepliwości krwi (np. sintrom, acenocumarol, warfin itp.)?	TAK / NIE

Uwaga:

Jeśli kolonoskopia wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu oraz nie wolno w tym dniu prowadzić pojazdów mechanicznych. Niekiedy konieczna jest również opieka drugiej osoby.

Jeśli nie wszystko jest zrozumiałe w załączonej informacji o badaniu, wymienionych powikłaniach bądź innych nurtujących problemach można przed badaniem zadać pytania lekarzowi i/lub pielęgniarce

..

(*) Oświadczenie zgody na odwrócenie strony informacyjnej



OŚWIADCZENIE PACJENTA Świadoma zgoda na badanie kolonoskopowe

Oświadczenie pacjenta:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem badania, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w wyniku w/w badania i zgadzam się na proponowane badanie kolonoskopowe;
- w pełni zrozumiałem informację o badaniu
- zgadzam się również na ewentualne zmodyfikowanie sposobu badania w niezbędnym zakresie (w tym m.in. o zabieg pobierania wycinków i zabieg polipektomii), jeżeli sytuacja by tego wymagała, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej;
- miałem możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i proszę o wykonanie proponowanego badania i ewentualnych zabiegów

.....

Nazwisko i imię badanego
lub prawnego opiekuna

.....

Data i podpis

Uwaga.

Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.