

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

1. OD 7 DNIA PRZED BADANIEM


- Unikać spożywania owoców drobnopestkowych (kiwi, winogrona, maliny itp.), pieczywa ziarnistego i maku. Odstawić preparaty żelaza, jeśli są przyjmowane.

2. OD 2 DNIA PRZED BADANIEM

- Pacjenci, u których lekarz rodzinny rozpoznał zaparcia stolca powinni przyjąć 2 tabletki BISACODYLU 1 dzień przed rozpoczęciem przygotowania środkiem przeczyszczającym.

3. DZIEŃ PRZED BADANIEM (*)

- Bez śniadania
- Należy pić głównie wodę niegazowaną (ewentualnie napój winogronowy)
- Można ssać landrynki JASNE
- Od ok. godz. 15-16 należy rozpocząć przyjmowanie roztworu środka przeczyszczającego np. FORTTRANS
- Pić według schematu:



Przyjmowanie środka przeczyszczającego zakończyć około godziny 20-22
W przypadku innych środków przeczyszczających przygotowanie według ulotki.

Do rozpuszczonego środka przeczyszczającego można dodać sok z cytryny i schłodzić go w lodówce. **Oprócz środka przeczyszczającego DODATKOWO należy wypić jak najwięcej wody.** Istotą przygotowania jest dobrze oczyszczone jelito. W razie przyjęcia mniejszej ilości środka przeczyszczającego jelito nie będzie dobrze oczyszczone i może to spowodować konieczność powtórzenia badania.

4. W DNIU BADANIA NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH POKARMÓW (*) **MOŻNA PIĆ WODĘ!**

**NA BADANIE ZGŁOSIĆ SIĘ ZE SKIEROWANIEM, EWENTUALNIE PODPISANĄ ZGODĄ –
JEŚLI BYŁA WYDANA W PRACOWNI
15 -20 MIN PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ BADANIA.**

(*) Pacjenci chorujący na cukrzycę i przyjmujący leki przeciwkrzepliwne powinni skonsultować przyjmowanie leków z lekarzem kierującym.